がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	R2.12.10	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	大腸癌(CK)-027	診療科名	消化器外科・消化器内科		
レジメン名	Cmab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ療法				
レジメン補足	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ				
がん腫など	BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
セツキシマブ(アービタックス)		(初回のみ) 400mg/m^2	○																											
セツキシマブ(アービタックス)		250mg/m^2								●							●							●						
エンコラフェニブ(ビラフトビ)		300mg 1日1回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ビニメチニブ(メクトビ)		45mg 1日2回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1コース期間	28 日	目標コース数	□有 (コース)	■無 (PDまで)
点滴時間	Day1：(初回)3時間30分 (2回目以降)2時間30分			
注意事項など				

Day 1（初回のみ）

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分点滴
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	生食	500mL	2時間点滴
	セツキシマブ	400mg/m^2	
③	生食	100mL	1時間点滴

Day 8以降（2回目以降）

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分点滴
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	生食	250mL	1時間点滴
	セツキシマブ	250mg/m^2	
③	生食	100mL	1時間点滴