

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H18.9.7	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-009	診療科名	血液内科			
レジメン名	mLSG-15 ①Vcap療法					
レジメン補足	プレドニゾン+ビンクリスチン+ドキソルビシン+シクロホスファミド					
がん腫など	成人T細胞リンパ腫(ATL)					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
プレドニゾン (プレドニン)		40mg/m ²	●																																		
ビンクリスチン (オンコピン)	壊死	1mg/m ² (MAX: 2mg)	●																																		
ドキソルビシン (アドリアシン)	壊死	40mg/m ²	●																																		
シクロホスファミド (エンドキサン)	炎症	350mg/m ²	●																																		
1コース期間	7日	目標コース数	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (4コース)							<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)																											
点滴時間	Day1: 3時間																																				
注意事項など	mLSG-15は①, ②, ③からなる治療を4週1コースとして計4コース実施する 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること ※ドキソルビシンによる心毒性予防のため、累積投与量は500mg/m²を超えないように注意すること																																				

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	生食	10mL	ワンショット
	プレドニゾン	40mg/m ²	
④	生食	20mL	ワンショット
	ビンクリスチン	1mg/m ²	
⑤	生食	100mL	全開
	ドキソルビシン	40mg/m ²	点滴
⑥	生食	500mL	2時間
	シクロホスファミド	350mg/m ²	点滴
⑦	生食	50mL	フラッシュ