

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H18.9.7	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-010	診療科名	血液内科		
レジメン名	mLSG-15 ②AMP療法				
レジメン補足	プレドニゾン+ドキシルビシン+ラニムスチン				
がん腫など	成人T細胞リンパ腫(ATL)				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
プレドニゾン (プレドニ)		40mg/m ²								●																				
ドキシルビシン (アドリアシン)	壊死	30mg/m ²								●																				
ラニムスチン (サイメリン)	壊死	60mg/m ²								●																				
1コース期間	7日	目標コース数	■有 (4コース)							□無 (PDまで)																				
点滴時間	Day8 : 1時間																													
注意事項など	mLSG-15は①, ②, ③からなる治療を4週1コースとして計4コース実施する ※ドキシルビシンによる心毒性予防のため、累積投与量は500mg/m ² を超えないように注意すること																													

Day 8

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	生食	10mL	ワンショット
	プレドニゾン	40mg/m ²	
④	生食	100mL	全開 点滴
	ドキシルビシン	30mg/m ²	
⑤	生食	100mL	30分 点滴
	ラニムスチン	60mg/m ²	
⑥	生食	50mL	フラッシュ