がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H18.9.7	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−011	診療科名	血液内科		
レジメン名	mLSG-15 ③VECP療法				
レジメン補足	プレドニゾロン+ビンデシン+カルボプラチン+エトポシド				
がん腫など	成人T細胞リンパ腫(ATL)				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
プレドニゾロン (プレドニン)		40mg/m^2															●	●	●											
カルボプラチン (パラプラチン)	炎症	250mg/m^2															●													
ビンデシン (フィルデシン)	壊死	2.4mg/m^2															●													
エトポシド (ベプシド、ラステット)	炎症	100mg/m^2															●	●	●											

1コース期間	7 日	目標コース数	■有 （ 4 コース）	□無 （PDまで）
点滴時間	Day15：3時間30分、 Day16, 17：2時間30分			
注意事項など	PVCフリー(フィルター付)の輸液セットを使用すること mLSG-15は①, ②, ③からなる治療を4週1コースとして計4コース実施する			

Day 15

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	生食	10mL	ワンショット
	プレドニゾロン	40mg/m^2	
④	生食	20mL	ワンショット
	ビンデシン	2.4mg/m^2	
⑤	5%ブドウ糖液	250mL	1時間点滴
	カルボプラチン	250mg/m^2	
⑥	5%ブドウ糖液	500mL	2時間点滴
	エトポシド	100mg/m^2	
⑦	生食	50mL	フラッシュ

Day 16, 17

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	生食	10mL	ワンショット
	プレドニゾロン	40mg/m^2	
③	5%ブドウ糖液	500mL	2時間点滴
	エトポシド	100mg/m^2	
④	生食	50mL	フラッシュ