がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H19.8.9	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−013	診療科名	血液内科		
レジメン名	CHASE療法				
レジメン補足	シクロホスファミド+シタラビン+エトポシド+デキサメタゾン				
がん腫など	悪性リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン (デキサート)		33mg	●	●	●																									
シクロホスファミド (エンドキサン)	炎症	1200mg/m^2	●																											
シタラビン (キロサイド)		2000mg/m^2		●	●																									
エトポシド (ベプシド、ラステット)	炎症	100mg/m^2	●	●	●																									

1コース期間	21 日	目標コース数	■有 （ 4 コース）	□無 （PDまで）
点滴時間	Day1-3：5時間30分			
注意事項など	PVCフリー(フィルター付)の輸液セットを使用すること 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること			

Day 1

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	**④と同時に投与**		
	生食	500mL	3時間点滴
	シクロホスファミド	1200mg/m^2	
⑤	5%ブドウ糖液	500mL	2時間点滴
	エトポシド	100mg/m^2	
⑥	生食	50mL	フラッシュ

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
④	**③と同時に投与**		
	生食	250mL	3時間点滴
	デキサメタゾン	33mg	
	炭酸水素ナトリウム(メイロン	100mL	

Day 2, 3

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	**③と同時に投与**		
	生食	500mL	3時間点滴
	シタラビン	2000mg/m^2	
④	5%ブドウ糖液	500mL	2時間点滴
	エトポシド	100mg/m^2	
⑤	生食	50mL	フラッシュ

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
③	**②と同時に投与**		
	生食	250mL	3時間点滴
	デキサメタゾン	33mg	