がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H20.11.25	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	ML−015	診療科名	血液内科		
レジメン名	MTX髄注療法				
レジメン補足	メトトレキサート+シタラビン+ステロイド				
がん腫など	悪性リンパ腫(中枢神経浸潤)				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
メトトレキサート(メソトレキセート)	炎症	15mg	●																											
シタラビン(キロサイド)		40mg	●																											
プレドニゾロン(プレドニン)		10~40mg	○	※いずれか選択																										
デキサメタゾン(デキサート)		3.3mg	○																											
1コース期間	1～3 週		目標コース数							□有 (コース)											□無 (PDまで)									
点滴時間	Day 1：髄注																													
注意事項など																														

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ

《髄注》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
②	注射用水	必要量	髄注
	メトトレキサート	15mg	
	シタラビン	40mg	
	プレドニゾロン	10~40mg	
	デキサメタゾン	3.3mg	