

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H22.12.29	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-017	診療科名	血液内科			
レジメン名	DeVIC療法					
レジメン補足	イトボシド+イホスファミド+カルボプラチン+デキサメタゾン					
がん腫など	悪性リンパ腫					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
デキサメタゾン (デキサート)		40mg	●	●	●																																			
カルボプラチン (パラプラチン)	炎症	300mg/m ²	●																																					
イトボシド (ヘブシド、ラステット)	炎症	100mg/m ²	●	●	●																																			
イホスファミド (イホマイド)	炎症	1500mg/m ²	●	●	●																																			
1コース期間	21日	目標コース数							<input checked="" type="checkbox"/> 有 (4コース)							<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)																								
点滴時間	Day1 : 12時間30分、 Day2-3 : 11時間																																							
注意事項など	PVCフリー(フィルター付)の輸液セットを使用すること 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること																																							

Day 1

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
②	生食	100mL	15分 点滴
	デキサメタゾン	40mg	
③	5%ブドウ糖液	250mL	90分 点滴
	カルボプラチン	300mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	500mL	2時間 点滴
	イトボシド	100mg/m ²	
⑤	生食	500mL	2時間 点滴
	イホスファミド	1500mg/m ²	
⑦	生食	50mL	フラッシュ
⑧	⑤の投与開始4時間後に投与開始		
	生食	100mL	30分
	メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ²	点滴
⑨	⑤の投与開始8時間後に投与開始		
	生食	100mL	30分
	メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ²	点滴

《側管》

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
⑥	⑤と同時に投与開始		
	生食	100mL	30分
	メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ²	点滴

Day 2, 3

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分
	デキサメタゾン	40mg	点滴
②	5%ブドウ糖液	500mL	2時間
	エトポシド	100mg/m ²	点滴
③	生食	500mL	2時間
	イホスファミド	1500mg/m ²	点滴
⑤	生食	50mL	フラッシュ
③の投与開始4時間後に投与開始			
⑥	生食	100mL	30分
	メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ²	点滴
③の投与開始8時間後に投与開始			
⑦	生食	100mL	30分
	メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ²	点滴

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
③と同時に投与開始			
④	生食	100mL	30分
	メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ²	点滴