## がん化学療法レジメン

|        |         |          |           |           | 穿    | 93版 | 改訂日 | H32.9.23 |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|------|-----|-----|----------|
| 登録日    | H19.8.9 | 実施区分     | □ 入院のみ    | ■ 入院及びタ   | 来    | 初回刀 | \院  | ■ 必要     |
| レジメン番号 | 悪性リンパ腫  | (ML)-018 | 診療科名      | 血液内科      |      |     |     |          |
| レジメン名  | EPOCH療法 |          |           |           |      |     |     |          |
| レジメン補足 | エトポシド+ビ | ンクリスチン+ド | キソルビシン+シケ | ロホスファミド+フ | プレドニ | ゾロン |     |          |
| がん腫など  | 悪性リンパ腫  |          |           |           |      |     |     |          |

|              | <b>&gt;</b>                             |                           |   |   | _ | /\I | 11 |   |   |   |   |    | _  |    |    |    |    |    |    | _  |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    |
|--------------|---|---------------------------|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 薬剤名          | 漏                                       | 投与量                       |   |   |   | (追  | 1) |   |   |   |   |    | 2  |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    |
| 20/11/11     | 出                                       | 1X 7 =                    | 1 | 2 | 3 | 4   | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| プレドニゾロン      |   | 60                        |   |   |   | •   | •  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (プレドニン)      |   | 60mg/m <sup>2</sup>       | • | • | • |     | •  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ドキソルビシン      | 壊                                       | 10                        |   |   |   |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (アドリアシン)     | 死                                       | 10mg/m <sup>2</sup>       | • | • | • |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ビンクリスチン      | 壊                                       | 0.4mg                     |   |   |   | •   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (オンコビン)      | 死                                       | 0.4mg                     | • | • | • |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| エトポシド        | 炎                                       | Γ0m σ /m²                 |   |   |   | •   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (ベプシド、ラステット) | 症                                       | 50mg/m <sup>2</sup>       | _ | _ | • |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シクロホスファミド    | 炎                                       | 750                       |   |   |   |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (エンドキサン)     | 症                                       | 750mg/m <sup>2</sup>      |   |   |   |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1コース期間       | 21 日 目標コース数 □有 ( コース) ■無 (PDまで)         |                           |   |   |   |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 点滴時間         | ı                                       | Day1-4:24時間持続点滴、 Day5:2時間 |   |   |   |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 注意事項など       | ビンクリスチンがフィルターに吸着する恐れがあるため、フィルターは使用しないこと |                           |   |   |   |     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## <u>Day 1-4</u>

## 《メイン》

| 11717      | "       |                        |              |  |  |  |
|------------|---------|------------------------|--------------|--|--|--|
| 投与<br>順序   | 投与薬剤名   | 投 <del>与</del> 量<br>単位 | 点滴時間<br>投与方法 |  |  |  |
| 7.007.3    | # ♦     |                        |              |  |  |  |
| 1          | 生食      | 50mL                   | ルートキープ       |  |  |  |
| (I)        | ※Day1のみ |                        |              |  |  |  |
| 2          | グラニセトロン | 3mg                    | ワンショット       |  |  |  |
| 3          | 生食      | 10mL                   | ワンショット       |  |  |  |
| (S)        | プレドニゾロン | 60mg/m <sup>2</sup>    | フンショット       |  |  |  |
|            | 生食      | 1000mL                 |              |  |  |  |
| <b>4</b> ) | ドキソルビシン | 10mg/m <sup>2</sup>    | 24時間         |  |  |  |
| 4)         | ビンクリスチン | 0.4mg                  | 持続点滴         |  |  |  |
|            | エトポシド   | 50mg/m <sup>2</sup>    | ]            |  |  |  |

## <u>Day 5</u>

《メイン》

| 投与 | 投与薬剤名         | 投与量                  | 点滴時間   |  |  |  |
|----|---------------|----------------------|--------|--|--|--|
| 順序 | <b>投</b> 一条刖石 | 単位                   | 投与方法   |  |  |  |
| 1  | グラニセトロン       | 3mg                  | ワンショット |  |  |  |
| 2  | 生食            | 10mL                 | ワンショット |  |  |  |
| 2  | プレドニゾロン       | 60mg/m <sup>2</sup>  | ノンショット |  |  |  |
| 3  | 生食            | 500mL                | 2時間    |  |  |  |
| 9  | シクロホスファミド     | 750mg/m <sup>2</sup> | 点滴     |  |  |  |
| 4  | 生食            | 50mL                 | フラッシュ  |  |  |  |