がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H19.8.9	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−019	診療科名	血液内科		
レジメン名	ESHAP療法				
レジメン補足	エトポシド+シスプラチン+メチルプレドニゾロン+シタラビン				
がん腫など	悪性リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
メチルプレドニゾロン (メドロール)		500mg	●	●	●	●	●																							
エトポシド (ベプシド、ラステット)	炎症	40mg/m^2	●	●	●	●																								
シスプラチン (ランダ、ブリプラチン)	炎症	25mg/m^2	●	●	●	●																								
シタラビン (キロサイド)		2000mg/m^2					●																							

1コース期間	21 日	目標コース数	□有 (コース)	■無 (PDまで)
点滴時間	Day1-4：24時間持続点滴、 Day5：2時間30分			
注意事項など	Day1-4はPVCフリー(フィルター付)の輸液セットを使用すること 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること			

Day 1-4

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
②	生食	100mL	15分点滴
	メチルプレドニゾロン	500mg	
③	生食	250mL	1時間点滴
	エトポシド	40mg/m^2	
④	生食	500mL	24時間持続点滴
	シスプラチン	25mg/m^2	

Day 5

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	15分点滴
	メチルプレドニゾロン	500mg	
②	生食	500mL	2時間点滴
	シタラビン	2000mg/m^2	
③	生食	50mL	フラッシュ