

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H23.1.31	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-023	診療科名	血液内科			
レジメン名	Hyper CVAD療法					
レジメン補足	シクロホスファミド+ドキシソルピシン+ビンクリスチン+デキサメタゾン					
がん腫など	高悪性度リンパ腫					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
デキサメタゾン (デカドロン)		40mg	●	●	●	●						●	●	●	●																					
シクロホスファミド (エンドキサン)	炎症	300mg/m ²	◎	◎	◎																															
ビンクリスチン (オンコピン)	壊死	2mg				●						●																								
ドキシソルピシン (アドリアシン)	壊死	50mg/m ²				●																														
1コース期間	21 日		目標コース数							<input checked="" type="checkbox"/> 有 (4 コース)							<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)																			
点滴時間	Day1-3 : 7時間、 Day4 : 24時間持続投与、 Day11 : 10分																																			
注意事項など	Hyper CVAD療法とMA療法を交互に各4コースずつ施行(計8コース) ※ドキシソルピシンによる心毒性予防のため、累積投与量は500mg/m²を超えないように注意すること																																			

Day 1-3

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	グラニセトロン	3mg	ワンショット
②	生食	100mL	15分
	デキサメタゾン	40mg	点滴
③	生食	500mL	3時間
	シクロホスファミド	300mg/m ²	点滴
④	生食	50mL	フラッシュ
⑤	③の投与開始12時間後に投与開始		
	生食	500mL	3時間
	シクロホスファミド	300mg/m ²	点滴
⑥	生食	50mL	フラッシュ

Day 4

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	グラニセトロン	3mg	ワンショット
②	生食	20mL	ワンショット
	ビンクリスチン	2mg	
③	生食	100mL	15分
	デキサメタゾン	40mg	点滴
④	生食	500mL	24時間
	ドキシソルピシン	50mg/m ²	点滴

Day 5

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	フラッシュ

Day 11

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分
	デキサメタゾン	40mg	点滴
②	生食	20mL	ワンショット
	ビンクリスチン	2mg	

Day 12-14

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分
	デキサメタゾン	40mg	点滴