がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H23.1.31	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−024	診療科名	血液内科		
レジメン名	MA療法				
レジメン補足	シタラビン+メトトレキサート				
がん腫など	高悪性度リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
メトトレキサート (メソトレキセート)	炎症	1000mg/m^2	●																											
シタラビン (キロサイド)		3000mg/m^2		◎	◎																									
1コース期間	21 日		目標コース数							■有 （ 4 コース）											□無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：24時間持続点滴、 Day2, 3：6時間																													
注意事項など	Hyper CVAD療法とMA療法を交互に各4コースずつ施行(計8コース) 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること メトトレキサート投与開始後の血中濃度が以下の濃度を超える場合はロイコボリンの増量や投与の延長を行うこと 24時間：1×10-5モル濃度　48時間：1×10-6モル濃度　72時間：1×10-7モル濃度																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	グラニセトロン	3mg	ワンショット
②	5%ブドウ糖液	250mL	1時間点滴
	メトトレキサート	200mg/m^2	
③	5%ブドウ糖液	500mL	23時間点滴
	メトトレキサート	800mg/m^2	

Day 2, 3

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	グラニセトロン	3mg	ワンショット
②	メチルプレドニゾロン	40mg	ワンショット
③	生食	500mL	3時間点滴
	シタラビン	3000mg/m^2	
④	生食	50mL	フラッシュ
⑤	メチルプレドニゾロン	40mg	ワンショット
⑥	生食	500mL	3時間点滴
	シタラビン	3000mg/m^2	
⑦	生食	50mL	フラッシュ