がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	2020/4/27

登録日	H25.2.18	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−027	診療科名	血液内科		
レジメン名	【Short hydration】GDP療法				
レジメン補足	シスプラチン+ゲムシタビン+デキサメタゾン				
がん腫など	B細胞非ホジキンリンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン (ランダ、ブリプラチン)	炎症	75mg/m^2	●																											
ゲムシタビン (ジェムザール)	炎症	1000mg/m^2	●							●																				
デキサメタゾン (デカドロン)		40mg(p.o.)	○	○	○	○																								

1コース期間	21 日	目標コース数	■有 （ 6 コース）	□無 （PDまで）
点滴時間	Day1：4時間、 Day8：1時間			
注意事項など	**★short hydration★** 全身状態の保たれた患者(PS：0-1)に用いる 腎機能障害のない患者に用いる 高度催吐性リスクのため、必ずイメンドを処方すること 穿刺から抜針までの間に1,000mL以上の経口補水液(OS-1など)を摂取すること 制吐目的に、Day2-4にデキサメタゾンの内服(8mg)を行うこと			

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分点滴
	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	
②	生食	100mL	30分点滴
	ゲムシタビン	1000mg/m^2	
③	開始液(ソルデム1)	500mL	1時間点滴
	KCL注	10mEq	
	硫酸マグネシウム	8mEq	
④	フロセミド	20mg	ワンショット
⑤	生食	必要量	1時間点滴
	シスプラチン	75mg/m^2	
	※総輸液量を300mLに調製		
⑥	開始液(ソルデム1)	500mL	1時間点滴
	KCL注	10mEq	

Day 8

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	15分点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
②	生食	100mL	30分点滴
	ゲムシタビン	1000mg/m^2	
③	生食	50mL	フラッシュ