がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H25.11.28	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−028	診療科名	血液内科		
レジメン名	GCD療法				
レジメン補足	カルボプラチン+ゲムシタビン+デキサメタゾン				
がん腫など	再発・難治性非ホジキンリンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン (パラプラチン)	炎症	AUC：5	●																											
ゲムシタビン (ジェムザール)	炎症	1000mg/m^2	●							●																				
デキサメタゾン (デカドロン)		40mg(p.o.)	○	○	○	○																								

1コース期間	21 日	目標コース数	■有 （ 2～4 コース）	■無 （PDまで）
点滴時間	Day1：3時間、 Day8：1時間			
注意事項など	**★患者限定レジメン** 本来はGDP療法を行うべきであるが、腎機能障害など何らかの理由でシスプラチンの投与が行うことができない患者のみ使用可能			

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	15分点滴
	グラニセトロン	3mg	
②	生食	100mL	30分点滴
	ゲムシタビン	1000mg/m^2	
	※点滴時間は1時間を超えないこと		
③	生食	500mL	2時間点滴
	カルボプラチン	AUC：5	
④	生食	50mL	フラッシュ

Day 8

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	15分点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
②	生食	100mL	30分点滴
	ゲムシタビン	1000mg/m^2	
	※点滴時間は1時間を超えないこと		
③	生食	50mL	フラッシュ