がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	R4.3.16

登録日	H24.6.5	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−030	診療科名	血液内科		
レジメン名	モガムリズマブ療法				
レジメン補足					
がん腫など	CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫、再発または難治性のCCR4予製の末梢性T細胞リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
モガムリズマブ (ポテリジオ)		1.0mg/kg	●																											

1コース期間	7 日	目標コース数	■有 （ 8 コースまで ）	□無 （PDまで）
点滴時間	Day1：2時間30分			
注意事項など	他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は2週間間隔で投与すること 本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミン(ネオマレルミンTR錠6mg))、解熱鎮痛剤(ロキソプロフェン・アセトアミノフェンなど)の前投与を行うこと ★注入速度は患者の状態に応じ適宜減速すること★			

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	250mL	ルートキープ
②	生食	200mL	2時間点滴
	モガムリズマブ	1.0mg/kg	
③	①の残りの生食を30分で滴下し終了		