がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	R2.1.9

登録日	H27.2.12	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−034	診療科名	血液内科		
レジメン名	ブレンツキシマブ-ベドチン療法				
レジメン補足					
がん腫など	再発・難治性(CD30陽性) ホジキンリンパ腫・未分化大細胞リンパ腫・末梢性T細胞リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ブレンツキシマブ ベドチン (アドセトリス)		1.8mg/kg	●																											

1コース期間	21 日	目標コース数	■有 (16 コースまで)	□無 (PDまで)
点滴時間	Day1：1時間			
注意事項など	ブレンツキシマブ-ベドチンの投与量が120mgを超える場合は生食を100mLから250mLにすること 体重が100kgを超える場合は体重を100kgとして投与すること(1回あたりの最大投与量は180mg)			

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	グラニセトロン	3mg	ワンショット
③	生食	100mL	30分点滴
	注射用水	必要量	
	ブレンツキシマブ-ベドチン	1.8mg/kg	
④	①の残りの生食でフラッシュ		