がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H30.11.8	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−045	診療科名	血液内科		
レジメン名	A＋AVD療法				
レジメン補足	ブレンツキシマブ-ベドチン＋ドキソルビシン+ビンブラスチン+ダカルバジン				
がん腫など	未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ブレンツキシマブ ベドチン (アドセトリス)		1.2mg/kg	●														●													
ドキソルビシン (アドリアシン)	壊死	25mg/m^2	●														●													
ビンブラスチン (エクザール)	壊死	6mg/m^2 (MAX：10mg)	●														●													
ダカルバジン	炎症	375mg/m^2	●														●													

1コース期間	28 日	目標コース数	■有 （ 6 コース）	□無 （PDまで）
点滴時間	Day1, 15：3時間			
注意事項など	体重が100kgを超える場合は100kgとして計算すること(1回あたりの最大投与量は120mg) 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること ダカルバジンは光により血管痛の頻度が上昇するため、調製および投与は遮光下で行うこと(ルートも遮光すること) ※ドキソルビシンによる心毒性予防のため、累積投与量は500mg/m^2を超えないように注意すること			

Day 1, 15

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	500mL	ルートキープ
⑦	①の残りの生食でフラッシュ		

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
②	生食	100mL	30分以上かけて点滴
	注射用水	必要量	
	ブレンツキシマブ-ベドチン	1.2mg/kg	
③	生食	50mL	全開で
	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	
	デキサメタゾン	13.2mg	
④	生食	100mL	30分点滴
	ドキソルビシン	25mg/m^2	
⑤	生食	50mL	全開で
	ビンブラスチン	6mg/m^2	
⑥	生食	100mL	30分以内に点滴
	ダカルバジン	375mg/m^2	