

**がん化学療法レジメン**

**第1版**    改訂日

登録日	R3.5.21	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-052	診療科名	血液内科		
レジメン名	Pola+BR療法(外来用)				
レジメン補足	ポラツズマブベドチン+ベンダムスチン+リツキシマブ				
がん腫など	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ポラツズマブベドチン (ボライビー)		1.8mg/kg	●																											
リツキシマブ		375mg/m <sup>2</sup>	●																											
ベンダムスチン (トレアキシ)	炎症	90mg/m <sup>2</sup>	●	●																										
1コース期間	21日	目標コース数	■有 ( 6 コースまで )														□無 (PDまで)													
点滴時間	Day1 : 5時間    Day2 : 1時間15分																													
注意事項など	リツキシマブは生食にて10倍に希釈して投与すること リツキシマブ、ポラツズマブベドチンのinfusion reactionを軽減させるため、レジメン開始前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・副腎皮質ホルモン剤等の前投与を考慮すること																													

**Day 1**

《メイン》    **フィルター付き輸液セットを使用**

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	必要量	注射箋参照
	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	
③	生食	50mL	フラッシュ
④	生食	100mL	90分点滴
	注射用水	必要量	
	ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	
初回投与時は90分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮可。			
⑤	生食	100mL	30分点滴

**閉鎖式器具のルートを使用**

⑥	生食	100mL	ルートキープ
⑦	アロキシ	0.75mg	ワンショット
⑧	生食	250mL	60分点滴
	ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	
⑧の投与終了後、⑥の残りの生食でフラッシュ			

**Day 2**

《メイン》    **閉鎖式器具のルートを使用**

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	生食	250mL	1時間点滴
	注射用水	必要量	
	ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	
②の投与終了後、①の残りの生食でフラッシュ			