

## がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	R3.7.8	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ ■ 入院及び外来		初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-053	診療科名	血液内科			
レジメン名	デニロイキン ジフチトクス療法					
レジメン補足						
がん腫など	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫、皮膚T細胞リンパ腫					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
デニロイキン ジフチトクス (レミト)		9 µg/kg	●	●	●	●	●																															
1コース期間		3 週	目標コース数							■有 ( 8 コースまで )							□無 (PDまで)																					
点滴時間	3時間15分																																					
注意事項など	<p style="color: red; margin: 0;">【フィルター使用不可】</p> <p style="margin: 0;">本剤投与開始30～60分前に解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン500mg)の前投与を行うこと。</p> <p style="margin: 0;">デニロイキン ジフチトクスは、生食にて50倍希釈(3µg/mL)まで可能。50倍希釈より濃度が薄くなる場合は、適宜生食量を調節すること。</p>																																					

### Day 1～5

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	15分 点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	10mg	
②	生食	250mL	1時間 点滴
③	生食	100mL	1時間 点滴
	デニロイキン ジフチトクス	9 µg/kg	
④	生食	250mL	1時間 点滴