

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H33.8.12	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	骨髄腫(MM)-021	診療科名	血液内科			
レジメン名	【皮下注】DBd療法					
レジメン補足	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン					
がん腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫					

【1～3コース目】

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																
ダラツムマブ (ダラキューロ)		1800mg	●								●												●																							
ボルテゾミブ (バルケイド)		1.3mg/m ²	●			●					●			●																																
デキサメタゾン (レナデックス)		20mg/日 (※)	●	●		●	●				●	●		●	●																															
1コース期間	21日		目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)																													
注意事項など	infusion reaction 予防のため、ダラツムマブ投与1～3時間前に副腎皮質ホルモンとアセトアミノフェン(650-1,000mg)、 抗ヒスタミン剤を投与すること (モンテルカスト10mg経口投与も考慮する) (セット処方あり; 入院注射オーダー→「セット」→「全科セット」→「血液内科用」→「ダラザレックス前投薬」) ★ダラツムマブ初回投与時は、輸血部(7204)に連絡すること 《デキサメタゾンの投与について(※)》 内服もしくは静脈内投与を行う ダラツムマブ投与日はインフュージョンリアクション予防のためダラツムマブ投与開始前に投与すること																																													

Day 1, 8

《皮下注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	1.2mL	皮下注
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	
②	ダラツムマブ	1800mg	皮下注

※ダラキューロは臍から左または右に約7.5cmの腹部皮下に、約3～5分かけて投与
 ※同一部位への反復注射は行わないこと

Day 4, 11

《皮下注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	1.2mL	皮下注
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	

Day 15

《皮下注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	ダラツムマブ	1800mg	皮下注

※ダラキューロは臍から左または右に約7.5cmの腹部皮下に、約3～5分かけて投与
 ※同一部位への反復注射は行わないこと

【4～8コース目】

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																	
ダラツムマブ (ダラキューロ)		1800mg	●																																												
ボルテゾミブ (ベルケイド)		1.3mg/m ²	●			●				●																																					
デキサメタゾン (レナデックス)		20mg/日 (※)	●	●		●	●			●	●																																				
1コース期間	21日	目標コース数	□有 (コース)							■無 (PDまで)																																					
注意事項など	infusion reaction予防のため、ダラツムマブ投与1～3時間前に副腎皮質ホルモンとアセトアミノフェン(650-1,000mg)、 抗ヒスタミン剤を投与すること (モンテルカスト10mg経口投与を考慮する) (セット処方あり；入院注射オーダー「セット」→「全科セット」→「血液内科用」→「ダラザレックス前投薬」) 9コース目以降は(MM-23)【皮下注】ダラツムマブ維持療法のレジメンに移行 《デキサメタゾンの投与について(※)》 内服もしくは静脈内投与を行う ダラツムマブ投与日はインフュージョンリアクション予防のためダラツムマブ投与開始前に投与すること																																														

Day 1

《皮下注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	1.2mL	皮下注
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	
②	ダラツムマブ	1800mg	皮下注

※ダラキューロは臍から左または右に約7.5cmの腹部皮下に、約3～5分かけて投与

※同一部位への反復注射は行わないこと

Day 4, 8, 11

《皮下注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	1.2mL	皮下注
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	