# がん化学療法レジメン

| 第2版 | 改訂日 | R3.10.14 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録日 | R3.8.12 | 実施区分 | □ 入院のみ ■ 入院及び外来 | 初回入院 | □ 必要 |
| レジメン番号 | 骨髄腫(MM)−023 | 診療科名 | 血液内科 | | |
| レジメン名 | 【皮下注】ダラツムマブ維持療法 | | | | |
| レジメン補足 | | | | | |
| がん腫 | 多発性骨髄腫、ALアミロイドーシス | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 1 (週) | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ダラツムマブ (ダラキューロ) | | 1800mg | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサメタゾン (レナデックス) | | (※) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1コース期間 | 28 日 | | 目標コース数 | | | | | | | □有 （ コース） | | | | | | | | | | | ■無 （PDまで） | | | | | | | | | |
| 注意事項など | infusion reaciton予防のため、ダラツムマブ投与1～3時間前に副腎皮質ホルモンとアセトアミノフェン(650-1,000mg)、抗ヒスタミン剤を投与すること（モンテルカスト10mg経口投与も考慮する）<br><br>《デキサメタゾンの投与について(※)》<br>投与の要否については臨床試験等のデータを参考にして決定すること<br>内服もしくは静脈内投与を行う<br>ダラツムマブ投与日はインフュージョンリアクション予防のためダラツムマブ投与開始前に投与すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Day 1**

**《皮下注》**

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量単位 | 点滴時間投与方法 |
|---|---|---|---|
| ① | ダラツムマブ | 1800mg | 皮下注 |
| | | | |

※ダラキューロは臍から左または右に約7.5cmの腹部皮下に、約3～5分かけて投与

※同一部位への反復注射は行わないこと