

がん化学療法レジメン

| | |
|-----|-----|
| 第1版 | 改訂日 |
|-----|-----|

| |
|-----|
| 改訂日 |
|-----|

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|------|--|------|--|--|
| 登録日 | R4.1.13 | 実施区分 | <input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来 | 初回入院 | <input checked="" type="checkbox"/> 必要 | |
| レジメン番号 | 骨髄腫(MM)-029 | 診療科名 | 血液内科 | | | |
| レジメン名 | 【皮下注】DPd療法 | | | | | |
| レジメン補足 | ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ+ボマリドミド+デキサメタゾン | | | | | |
| がん腫 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 1 (週) | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ダラツムマブ (ダラキューロ) | | 1800mg | ● | | | | | | | ○ | | | | | | | ● | | | | | | | ○ | | | | | | |
| ボマリドミド (ボマリスト) | | 4mg (内服) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| デキサメタゾン (レナデックス) | | 40mg/週 (※) | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 1コース期間 | 28日 | 目標コース数 | <input type="checkbox"/> 有 (コース) | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点滴時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項など | infusion reaction 予防のため、ダラツムマブ投与1~3時間前に副腎皮質ホルモンとアセトアミノフェン(650-1,000mg)、抗ヒスタミン剤を投与すること(モンテルカスト10mg経口投与も考慮する) (セット処方あり; 入院注射オーダー→「セット」→「全科セット」→「血液内科用」→「ダラザレックス前投薬」) 《ダラツムマブの投与について》 1-2コース目はday 1, 8, 15, 22に、3-6コース目はday 1, 15に、7コース目以降はday 1のみに投与すること 7コース目以降は(MM-23)【皮下注】ダラツムマブ維持療法のレジメンに移行 《デキサメタゾンの投与について(※)》 内服もしくは静脈内投与を行う 週1回40mg/日投与(臨床試験ではダラキューロ投与日とその翌日に20mgずつ分割して投与) ★ダラツムマブ初回投与時は、輸血部(7204)に連絡すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Day 1, 8, 15, 22

《皮下注》

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量 単位 | 点滴時間 投与方法 |
|------|--------|-----------|--------------|
| ① | ダラツムマブ | 1800mg | 皮下注 |

※ダラキューロは臍から左または右に約7.5cmの腹部皮下に、約3~5分かけて投与

※同一部位への反復注射は行わないこと