

# がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H23.9.8	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)-008	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	【患者限定】GCb療法				
レジメン補足	ゲムシタピン+カルボプラチン				
がん腫など	尿路上皮癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
ゲムシタピン (ジェムザール)	炎症	1000mg/m <sup>2</sup>	●																													
カルボプラチン (パラプラチン)	炎症	AUC : 4.5	●																													
1コース期間	21 日		目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)															
点滴時間	Day1 : 約3時間、 Day8 : 約1時間																															
注意事項など	【患者限定】腎機能低下や高齢などの理由でシスプラチンの忍容性がないと判断される患者にのみ使用すること ※尿路上皮癌の標準治療はゲムシタピン+シスプラチンの併用療法である																															

## Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	100mL	30分 点滴
	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	
※点滴時間は1時間を超えないこと			
③	生食	500mL	2時間 点滴
	カルボプラチン	AUC : 4.5	
④	生食	50mL	フラッシュ

## Day 8

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
②	生食	100mL	30分 点滴
	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	
※点滴時間は1時間を超えないこと			
③	生食	50mL	フラッシュ