がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	R1.10.10

登録日	H26.11.13	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)−010	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	カバジタキセル+プレドニゾロン療法				
レジメン補足					
がん腫など	前立腺癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カバジタキセル(ジェブタナ)	炎症	25mg/m^2	●																											
1コース期間	21 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：約2時間																													
注意事項など	PVCフリー(フィルター付)の輸液セットを用いること 治療期間中はプレドニゾロン1回5mgを1日2回、朝・昼に内服																													

Day 1

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	ファモチジン(ガスター)	20mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	5%ブドウ糖液(右記載参照)	250mL	90分点滴
	カバジタキセル	25mg/m^2	
③	生食	50mL	フラッシュ

※点滴用液の最終濃度は、0.10～0.26mg/mLとなるよう調製する。

カバジタキセル投与量	輸液バッグの輸液量
~25mg	100mL
25mg~65mg	250mL
65mg~	500mL