がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	R2.2.13	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)−016	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	ペムブロリズマブ＋アキシチニブ併用療法				
レジメン補足					
がん腫など	腎細胞癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ペムブロリズマブ (キイトルーダ)		200mg	●																											
アキシチニブ (インライタ)		1回5mg 1日2回内服	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
1コース期間	21 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：1時間																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること インフュージョンリアクションが観察された場合は適切な対処を行い、次回投与以降は支持療法として抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミン(ポララミン)注など)の前投与を行うこと																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
	※②の投与終了後30分かけて投与		

《側管》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
②	生食	100mL	30分 点滴
	ペムブロリズマブ	200mg	