

がん化学療法レジメン

第1版	改訂日
-----	-----

登録日	R2.11.12	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来		初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要	
レジメン番号	泌尿器(UR)-020	診療科名	泌尿器科				
レジメン名	(Q6W)尿路上皮癌ペムプロリズマブ療法						
レジメン補足							
がん腫など	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌						

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
ペムプロリズマブ (キイトルーダ)		400mg/body	●																																							
1コース期間	42 日	目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																										
点滴時間	Day1 : 1時間																																									
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること インフュージョンリアクションが観察された場合は適切な対処を行い、次回投与以降は支持療法として抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミン(ポラミン)注など)の前投与を行うこと																																									

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
※②の投与終了後30分かけて投与			

《側管》

インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
②	生食	100mL	30分
	ペムプロリズマブ	400mg	点滴