## がん化学療法レジメン

					第1	.版	改訂日	]	
登録日	R3.10.14	実施区分	□ 入院のみ	■ 入院及び外	来	初回入	、院	■ 必要	
レジメン番号	泌尿器(UR)	-023	診療科名	泌尿器科					
レジメン名	(Q2W)ニボルマブ+カボザンチニブ療法								
レジメン補足									
がん腫など	根治切除不能	能又は転移性の	腎細胞癌						

薬剤名	漏	投与量			1	(退	1)						2							3							4			
	出	汉一里	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ニボルマブ (オプジーボ)		240mg/body	•																											
カボザンチニブ (カボメティクス)		40mg/日	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
1コース期間	14 日 目標コース数 □有 ( コース) ■無 (PDまで)								)																					
点滴時間	I	Day1:1時間																												
注意事項など	カボメティクスは食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けること(食後投与はCmax、AUCがそれぞれ増加)																													

## <u>Day 1</u>

《メイン》

投与	<b>小片弦刘</b> 夕	投与量	点滴時間				
順序	投与薬剤名	単位	投与方法				
1	生食	100mL	ルートキープ				
<u>(1)</u>	※②の投与終了後30分かけて						

《側管	》 インラインフィルター付き	の輸液セット			
投与	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	投与量	点滴時間		
順序	投与薬剤名	単位	投与方法		
(2)	生食	100mL	30分		
2	ニボルマブ	240mg	点滴		