がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	R3.10.14	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)−024	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	(Q4W)ニボルマブ+カボザンチニブ療法				
レジメン補足					
がん腫など	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ニボルマブ (オプジーボ)		480mg/body	●																											
カボザンチニブ (カボメティクス)		40mg/日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1コース期間	28 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：1時間																													
注意事項など	カボメティクスは食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けること（食後投与はCmax、AUCがそれぞれ増加）																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
	※②の投与終了後30分かけて投与		

《側管》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
②	生食	100mL	30分点滴
	ニボルマブ	480mg	