がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	R3.12.9	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)−026	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	エンホルツマブ ベドチン療法				
レジメン補足					
がん腫など	尿路上皮癌（PD-1/PD-L1阻害剤による治療後）				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エンホルツマブ ベドチン（パドセブ）		1.25mg/kg	●							●							●													

1コース期間	28 日	目標コース数	□有 （ コース）	■無 （PDまで）
点滴時間	Day1,8,15：約30分			
注意事項など	・1回量として125mgを超えないこと。 ・インフュージョンリアクションの既往歴がある患者には、本剤投与開始30～60分前に前投薬（解熱鎮痛剤や抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤等）を考慮すること。			

Day 1,8,15

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	50mL	30分点滴
	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	
③	①の残りの生食でフラッシュ		