

# がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R5.7.1

登録日	H18.9.7	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-002	診療科名	血液内科		
レジメン名	THP-COP療法				
レジメン補足	ピラルビシン+シクロホスファミド+ビンクリスチン(ビンデシン)+プレドニゾロン				
がん腫など	悪性リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
プレドニゾロン (プレドニン)		60mg/m <sup>2</sup>	●	○	○	○	○																																				
ピラルビシン (ピノルビン)	壊死	50mg/m <sup>2</sup>	●																																								
ビンクリスチン (オンコビン)	壊死	1.4mg/m <sup>2</sup> (MAX: 2mg)	○																																								
ビンデシン (フィルデシン)	壊死	0.06mg/kg (MAX: 4mg)	○																																								
シクロホスファミド (エンドキサン)	炎症	750mg/m <sup>2</sup>	●																																								
1コース期間		21 日	目標コース数							■有 ( 6~8 コース)							□無 (PDまで)																										
点滴時間		Day1: 3時間																																									
注意事項など		Day2以降のプレドニゾロンは内服投与 制吐目的にアプレビタント(イメント、プロイメント)の投与を検討すること <b>※ピラルビシンによる心毒性予防のため、累積投与量には注意すること</b>																																									

## Day 1

《メイン》

閉鎖式器具のルートを使用

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	生食	10mL	
	プレドニゾロン	60mg/m <sup>2</sup>	ワンショット
	生食	20mL	
<b>以下のいずれかの薬剤を選択</b>			
④	ビンクリスチン	1.4mg/m <sup>2</sup>	ワンショット
	ビンデシン	0.06mg/kg	
⑤	生食	100mL	
	ピラルビシン	50mg/m <sup>2</sup>	全開投与
⑥	生食	500mL	
	シクロホスファミド	750mg/m <sup>2</sup>	2時間 点滴
⑦	生食	50mL	フラッシュ