

がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R6.4.18

登録日	H27.1.15	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	胃癌(MK)-009	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	CapeOX(XELOX)療法				
レジメン補足	カペシタビン+オキサリプラチ				
がん腫など	胃癌				

薬剤名	漏出 炎症	投与量	1(週)							2							3							4																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
オキサリプラチ	炎症	130mg/m ²	●																																								
カペシタビン		※下図参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
1コース期間		21 日	目標コース数							■有 (8 コース※)							■無 (PDまで)																										
点滴時間		Day1 : 2時間30分																																									
注意事項など		制吐目的のDay2-3にデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することを考慮 カペシタビンの投与量はC法を用いる <u>※ 術後補助療法に用いる場合は8コースを上限とする</u>																																									

《カペシタビン投与量の目安》

体表面積(m ²)	~1.36	1.36 ~ 1.66	1.66 ~ 1.96	1.96~
カペシタビン投与量 (1日2回内服)	1200mg/回	1500mg/回	1800mg/回	2100mg/回

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	パロノセトロン	0.75mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	5%ブドウ糖液	500mL	2時間 点滴
	オキサリプラチ	130mg/m ²	
③	5%ブドウ糖液	100mL	フラッシュ