

がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R6.4.22

登録日	R4.1.13	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	胃癌(MK)-025	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	Nivo+SOX療法				
レジメン補足	ニボルマブ+S-1+オキサリプラチン				
がん腫など	化学療法歴のないHER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
ニボルマブ (オプジーーボ)		360mg/body	●																																														
オキサリプラチン	炎症	130mg/m ²	●																																														
S-1		※下図参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																											
1コース期間		21日	目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)	■無 (PDまで)							■無 (PDまで)							■無 (PDまで)																								
点滴時間		Day1: 3時間30分																																															
注意事項など		制吐目的のDay2-3のデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することを考慮																																															

《S-1投与量の目安》

体表面積(m ²)	~1.24	1.25 ~ 1.49	1.5~
S-1投与量 (1日2回内服)	80mg/day	100mg/day	120mg/day

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
③	①の残りの生食でフラッシュ		
④	生食	100mL	15分 点滴
	パロノセトロン デキサメタゾン(デキサート)	0.75mg 9.9mg	
⑤	5%ブドウ糖液	500mL	2時間 点滴
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	100mL	フラッシュ

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
②	生食	100mL	30分 点滴
	ニボルマブ	360mg	