

がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

登録日	R7.5.8	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	胃癌(MK)-031	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	RAM+CPT-11療法				
レジメン補足	ラムシルマブ+イリノテカン				
がん腫など	治癒切除不能な進行・再発胃癌(2次治療)				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
ラムシルマブ (サイラムザ)		8mg/kg	●																																														
イリノテカン	炎症	150mg/m ²	●																																														
1コース期間	14日		目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																																
点滴時間	Day1(初回) : 3時間30分、 Day1(2回目以降) : 3時間																																																
注意事項など	• 制吐目的のDay2-3のデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することを考慮 • HER2・UGT1A1確認 • UGT1A1 : *6または*28ホモ接合型または両者の複合ヘテロ接合型 120mg/m ² から開始(2段階減量まで可)																																																

Day 1

《メイン》 フィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	30分 点滴
	パロノセトロン	0.75mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	生食	250mL	下記(※)
	ラムシルマブ	8mg/kg	参照
③	生食	50mL	フラッシュ
④	5%ブドウ糖	250mL	90分 点滴
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	生食	50mL	フラッシュ

※初回投与時は60分かける。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分で投与してよい。