

がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R6.4.17

登録日	H26.3.13	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	大腸(CK)-020	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	パニツムマブ+イリノテカン療法				
レジメン補足					

がん腫など KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
パニツムマブ (ペクティビックス)		6mg/kg	●																																														
イリノテカン	炎症	150mg/m ²	●																																														
1コース期間	14日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																																							
点滴時間	Day1: 4時間30分																																																
注意事項など	制吐目的のDay2-3のデキサメタゾン(8mg)は省略することを考慮																																																

Day 1

《メイン》

フィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	パロノセトロン	0.75mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	100mL	1時間 点滴
	パニツムマブ	6mg/kg	
③	生食	100mL	1時間 点滴
	※2回目以降は過去のインフュージョンリアクションの有無を確認し、15分まで短縮可		
④	生食	500mL	2時間 点滴
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	生食	50mL	フラッシュ