

# がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H22.12.23	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	胆・膵臓癌(PK)－002		診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	S-1+ゲムシタビン					
レジメン補足						
がん腫など	膵臓癌					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ゲムシタビン (ジェムザール)	炎症	1000mg/m <sup>2</sup>	●							●																			
S-1 (TS-1)		※下図参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
1 コース期間	21 日	目標コース数							□有 (    コース)							■無 (PDまで)													
点滴時間	Day1, 8 : 約1時間																												
注意事項など																													

## 《S-1投与量の目安》

体表面積(m <sup>2</sup> )	～1.24	1.25 ～ 1.49	1.5～
S-1投与量 (1日2回内服)	80mg/day	100mg/day	120mg/day

## Day 1, 8

《メイン》

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	点滴
②	生食	100mL	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴
※点滴時間は1時間を超えないこと			
③	生食	50mL	フラッシュ