

がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R6.5.2

登録日	H27.1.15	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	胆・膵臓癌(PK)-006	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	nab-PTX+ゲムシタビン療法				
レジメン補足	アルブミン懸濁型パクリタキセル+ゲムシタビン				
がん腫など	膵臓癌				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
nab-PTX (アラキサン)	壊死	125mg/m ²	●							●						●																											
ゲムシタビン	炎症	1000mg/m ²	●							●						●																											
1コース期間	28日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 (コース)														<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																										
点滴時間	Day1, 8, 15 : 約1時間30分																																										
注意事項など	<p>【フィルター使用不可】 アルブミン懸濁型パクリタキセルは特定生物由来製品に該当する <u>使用前に『輸血療法及び特定生物由来製品使用に関する同意書』で患者の同意を得ること</u> 本剤を投与した場合、処方せんに医薬品名(販売名)、その製造番号または製造記号(ロット番号)、使用年月日、使用した患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保管すること 制吐目的のDay2-3, Day9-10, Day16-17のデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することも考慮 </p>																																										

Day 1, 8, 15

《メイン》 《禁：フィルター付の輸液セット》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	パロノセトロン	0.75mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	必要量	30分 点滴
	nab-PTX	125mg/m ²	
③	生食	50mL	フラッシュ
④	生食	100mL	30分 点滴
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
※点滴時間は1時間を超えないこと			
⑤	生食	50mL	フラッシュ