

# がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R6.5.2

|        |                       |      |  |      |  |
|--------|-----------------------|------|--|------|--|
| 登録日    | R5.1.25               | 実施区分 | <input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来 | 初回入院 | <input checked="" type="checkbox"/> 必要 |
| レジメン番号 | 胆・膵臓癌(PK)-009         | 診療科名 | 消化器内科・消化器外科  |      |  |
| レジメン名  | (Short)デュルバルマブ+GC療法   |      |  |      |  |
| レジメン補足 | デュルバルマブ+ゲムシタビン+シスプラチン |      |  |      |  |
| がん腫など  | 治癒切除不能な胆道癌            |      |  |      |  |

| 薬剤名                 | 漏出 | 投与量   | 1(週)   |   |   |   |   |   |   | 2        |   |    |    |    |    |    | 3        |    |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                     |    |   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| デュルバルマブ<br>(イミフィンジ) |    | 1500mg  | ●      |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シスプラチン              | 炎症 | 25mg/m <sup>2</sup>   | ●      |   |   |   |   |   |   | ●        |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ゲムシタビン              | 炎症 | 1000mg/m <sup>2</sup>   | ●      |   |   |   |   |   |   | ●        |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1コース期間              |    | 21日   | 目標コース数 |   |   |   |   |   |   | ■有(8コース) |   |    |    |    |    |    | □無(PDまで) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点滴時間                |    | Day1: 5時間15分 Day8: 4時間  |        |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項など              |    | シスプラチン投与日は1日に500mL以上の経口補水液を摂取すること<br>制吐目的のDay2-3, 9-10のデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することも考慮<br>体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgとする |        |   |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Day 1

《メイン》

| 投与順序 | 投与薬剤名                | 投与量<br>単位 | 投与方法<br>点滴時間 |
|------|----------------------|-----------|--------------|
| ①    | 生食                   | 100mL     | ルートキープ       |
|      | ※②の投与後、①の残りの生食でフラッシュ |           |              |
| ③    | 生食                   | 1000mL    | 4時間          |
|      | 硫酸マグネシウム             | 20mEq     | 点滴           |

| 《側管》             |                | フィルター付きの輸液セット         |              |
|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 投与順序             | 投与薬剤名          | 投与量<br>単位             | 投与方法<br>点滴時間 |
| ②                | 生食             | 250mL                 | 1時間          |
|                  | デュルバルマブ        | 1500mg                | 点滴           |
| ③の投与開始と同時に投与開始   |                |                       |              |
| ④                | 生食             | 100mL                 | 30分          |
|                  | パロノセトロン        | 0.75mg                | 点滴           |
|                  | デキサメタゾン(デキサート) | 9.9mg                 |              |
| ⑤                | 生食             | 100mL                 | 30分          |
|                  | ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴           |
| ※点滴時間は1時間を超えないこと |                |                       |              |
| ⑥                | 生食             | 50mL                  | フラッシュ        |
| ⑦                | フロセミド          | 20mg                  | ワンショット       |
|                  | 生食             | 必要量                   | 1時間          |
| ⑧                | シスプラチン         | 25mg/m <sup>2</sup>   | 点滴           |
| ※総輸液量を300mLに調製   |                |                       |              |

## Day 8

《メイン》

| 投与順序 | 投与薬剤名    | 投与量<br>単位 | 点滴時間<br>投与方法 |
|------|----------|-----------|--------------|
| ①    | 生食       | 1000mL    | 4時間          |
|      | 硫酸マグネシウム | 20mEq     | 点滴           |

| 《側管》             |                |                       |              |
|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 投与順序             | 投与薬剤名          | 投与量<br>単位             | 点滴時間<br>投与方法 |
| ②                | ①の投与開始と同時に投与開始 |                       |              |
|                  | 生食             | 100mL                 | 30分          |
|                  | パロノセトロン        | 0.75mg                | 点滴           |
|                  | デキサメタゾン(デキサート) | 9.9mg                 |              |
| ③                | 生食             | 100mL                 | 30分          |
|                  | ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴           |
| ※点滴時間は1時間を超えないこと |                |                       |              |
| ④                | 生食             | 50mL                  | フラッシュ        |
| ⑤                | フロセミド          | 20mg                  | ワンショット       |
|                  | 生食             | 必要量                   | 1時間          |
| ⑥                | シスプラチン         | 25mg/m <sup>2</sup>   | 点滴           |
| ※総輸液量を300mLに調製   |                |                       |              |