

がん化学療法レジメン

第3版 改訂日 2024/4/18

登録日	R3.11.14	実施区分	<input checked="" type="checkbox"/> 入院のみ <input type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	頭頸部(HN)-018	診療科名	耳鼻咽喉科		
レジメン名	Weekly CDDP+RT療法				
レジメン補足	シスプラチニ				
がん腫など	頭頸部癌				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
シスプラチニ	炎症	30~40mg/m ²	●																																								
1コース期間	7日	目標コース数	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (7コース)														<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)																										
点滴時間	Day1: 8時間																																										
注意事項など	放射線照射は最大70Gy(2Gy/day)まで シスプラチニ投与後1週間は尿量2,000mL以上を保つように そのため、シスプラチニ投与後最低5日間は1日に1,000mL以上の補液又はそれに相当する経口補水液を摂取すること 制吐目的に、Day1-4にオランザピンの内服を行うこと(糖尿病患者には禁忌)																																										

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	500mL	2時間 点滴
③	生食	500mL	2時間
	硫酸マグネシウム	20mEq	点滴
④	プロセミド	20mg	ワンショット
⑤	乳酸リングル液(ソララクト)	500mL	2時間 点滴
⑦	乳酸リングル液(ソララクト)	500mL	2時間 点滴

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法	
①の投与終了後に投与開始				
②	生食	100mL	30分 点滴	
	パロノセトロン	0.75mg		
	ホスネツピタント(アロカリス)	235mg		
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg		
⑤の投与開始と同時に投与開始				
⑥	生食	必要量	2時間 点滴	
	シスプラチニ	30~40mg/m ²		
※総輸液量を300mLに調製				

Day 2-4

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	1000mL	24時間 持続点滴

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	15分 点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	