

# がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R7.6.12

登録日	H22.6.10	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要				
レジメン番号	婦人科(GY)-027	診療科名	婦人科						
レジメン名	Weeklyイリノテカン療法								
レジメン補足									
がん腫など	卵巣癌、子宮頸癌								
薬剤名	漏出	投与量	1 (週)	2	3	4			
			1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28			
イリノテカン	炎症	100mg/m <sup>2</sup>	●	●	●	●			
			5 (週)	6	7	8			
			29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56			
1 コース期間	35 日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 ( コース)			<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)			
点滴時間	Day1, 8, 15, 22 : 約2時間30分								
注意事項など	制吐目的のDay2-3, Day9-10, Day16-17, Day23-24のデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することを考慮								

## Day 1, 8, 15

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	パロノセトロン注	0.75mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	500mL	2時間 点滴
	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	
③	生食	50mL	フラッシュ