

がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R6.6.3

登録日	H24.4.2	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	婦人科(GY)-037	診療科名	婦人科		
レジメン名	婦人科BEP療法				
レジメン補足	ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチニ				
がん腫など	胚細胞腫瘍				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ブレオマイシン (ブレオ)		20mg/m ² MAX:30mg/body		●							●						●													
エトポシド	炎症	100mg/m ²	●	●	●	●	●																							
シスプラチニ	炎症	20mg/m ²	●	●	●	●	●																							
1コース期間		21 日	目標コース数							■有 (<u>※注意事項参照</u>)							□無 (PDまで)													
点滴時間		Day1-5 : 8時間30分、 Day8,15 : 1時間																												
注意事項など		制吐目的に、オランザピンの投与を行うこと(糖尿病患者には禁忌) <u>※完全摘出例で腫瘍マーカーが陰性化していれば3コース</u> <u>※不完全摘出例では腫瘍マーカー陰性化後さらに1~2コース</u> ブレオマイシンの総投与量は360mg/bodyを超えないこと																												

Day 1

《メイン》

フィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	30分 点滴
	グラニセトロン	3mg	
	ホスネツピタント(アロカリス)	235mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	5%ブドウ糖液	500mL	2時間 点滴
	エトポシド	100mg/m ²	
③	生食	500mL	90分 点滴
	フロセミド	20mg	
④	生食	250mL	90分 点滴
	シスプラチニ	20mg/m ²	
⑤	生食	1000mL	3時間 点滴

Day 2

《メイン》

フィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	グラニセトロン	3mg	
②	生食	50mL	全開 点滴
	ブレオマイシン	20mg/m ²	
<u>※ブレオマイシン(最大量) : 30mg/body</u>			
③	5%ブドウ糖液	500mL	2時間 点滴
	エトポシド	100mg/m ²	
④	生食	500mL	90分 点滴
	フロセミド	20mg	
⑤	生食	250mL	90分 点滴
	シスプラチニ	20mg/m ²	
⑥	生食	1000mL	3時間 点滴

Day 3-5

《メイン》

フィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	グラニセトロン	3mg	
②	5%ブドウ糖液	500mL	2時間 点滴
	エトポシド	100mg/m ²	
③	生食	500mL	90分 点滴
	フロセミド	20mg	
④	生食	250mL	90分 点滴
	シスプラチニ	20mg/m ²	
⑤	生食	1000mL	3時間 点滴

Day 9, 16

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	生食	50mL	
②	ブレオマイシン	20mg/m ²	全開 点滴
	<u>※ブレオマイシン(最大量) : 30mg/body</u>		
③	生食	50mL	フラッシュ