

がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

登録日		実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)-007	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	テムシロリムス療法				
レジメン補足					
がん腫など	進行・再発腎細胞癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
テムシロリムス (トーリセル)	炎症	25mg	●																																															
1コース期間	7 日		目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																																	
点滴時間	Day1：約1時間																																																	
注意事項など	PVCフリー(フィルター付)の輸液セットを用いること 調製後、6時間以内に投与を終了すること																																																	

Day 1

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	ワンショット
③	生食	250mL	60分
	テムシロリムス	25mg	点滴
④	①の残りの生食でフラッシュ		

※溶解方法※

添付溶解液より1.8mL抜き取り、1バイアル(25mg)を溶解する。(0.1mg/mLとなる)
必要量(25mg=2.5mL)を抜き取り、生理食塩液に希釈する。