がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H22.12.23	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	膠原病(CD)−003	診療科名	膠原病内科		
レジメン名	トシリズマブ療法				
レジメン補足					
がん腫など	関節リウマチ				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
トシリズマブ (アクテムラ)		8mg/kg	●																											

1コース期間	28 日	目標コース数	□有 （ コース）	■無 （PDまで）
点滴時間	Day1：約1時間			
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること			

Day 1

《メイン》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	100mL	**右図(※)**
	トシリズマブ	8mg/kg	点滴
③	①の残りの生食でフラッシュ		

※投与速度※

開始−15分：10mL/Hにて開始

投与開始15分後

アナフィラキシー様症状がないことを確認し、

点滴速度を約160mL/Hに上げ、45分間で点滴