## がん化学療法レジメン

					穿	第1版	改訂日	
登録日		実施区分	□ 入院のみ	■ 入院及びタ	来	初回刀	\院	■ 必要
レジメン番号	大腸(CK)-(	000	診療科名	消化器外积	科			
レジメン名	Bev+IRIS	療法						
レジメン補足	ベバシズマブー	+S-1+イリノテカ	ン					
がん腫など	切除不能結	揚•直腸癌						

薬剤名	漏	投与量	<b>1</b> (週)								2							3							4					
<b>采</b> 則石	出	仅一里	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ	炎	7.5mg/kg																												
(アバスチン)	症																													
イリノテカン	炎	150mg/m <sup>2</sup>	۱.																											
(トポテシン、カンプト)	症	1501119/111																												
S-1		※下図参照	۱.																											
(TS-1)		<u> </u>		•		•	•	•	•			•																		
1コース期間	21 日 目標				目標コース数 □有 ( コース) ■無 (PDまで)											)														
点滴時間	Day1: (初回) 4時間 (2回目) 3時間30分 (3回目以降) 3時間																													
注意事項など 制吐目的に、Day2-3にデキサメタゾンの内服(8mg)もしくは点滴投与(6.6mg)を行うこと																														

## 《S-1投与量の目安》

体表面積(m <sup>2</sup> )	~1.24	$1.25 \sim 1.49$	1.5~
S-1投与量	20ma/day	100mg/day	120mg/day
(1日2回内服)	80mg/day	100mg/day	120111g/uay

## <u>Day 1</u>

《メイン》

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法									
	生食	100mL	15分									
1	グラニセトロン	3mg	点滴									
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg										
	生食	100mL	<u>下記(※)</u>									
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴									
	※初回投与時は90分かける。初回投与時の忍容性が良											
2	好であれば2回目は60分で投与してもよい。2回目の投与											
	においても忍容性が良好であればそれ以降は30分で投与											
	<u>とする。</u>		_									
3	生食	50mL	フラッシュ									
<b>4</b> )	生食	500mL	2時間									
4)	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴									
(5)	生食	50mL	フラッシュ									