

がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

登録日	H24.5.2	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	大腸(CK)-008	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	セツキシマブ+FOLFIRI療法				
レジメン補足	セツキシマブ+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル				
がん腫など	切除不能結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
セツキシマブ (アービタックス)	炎症	400mg/m ² (初回のみ)	○																											
セツキシマブ (アービタックス)	炎症	250mg/m ²	●						●																					
イリノテカン (トポテシン、カンプト)	炎症	150mg/m ²	●																											
レボホリナート		200mg/m ²	●																											
フルオロウラシル (5-FU)	炎症	400mg/m ²	●																											
フルオロウラシル (5-FU)	炎症	2400mg/m ²	●	●	●																									
1コース期間	14日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																				
点滴時間	Day8 : 2時間30分																													
注意事項など	制吐目的に、Day2-3にデキサメタゾンの内服(8mg)もしくは点滴投与(6.6mg)を行うこと																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	30分 点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	《初回のみ》		
	生食	500mL	2時間 点滴
	セツキシマブ	400mg/m ²	
	《2回目以降》		
生食	250mL	1時間 点滴	
セツキシマブ	250mg/m ²		
③	生食	50mL	フラッシュ
④	生食	250mL	2時間 点滴
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑥	生食	100mL	全開 点滴
	フルオロウラシル	400mg/m ²	

《側管》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
⑤	④の投与と同時に投与開始		2時間 点滴
	生食	250mL	
	レボホリナート	200mg/m ²	

⑥の投与以降はインフューザーポンプと末梢持続点滴で以下の投与方法を選択

Day 1-3 (インフューザーポンプ)

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
⑦	生食	必要量	46時間 持続点滴
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	
⑧	生食注シリンジ	10mL	フラッシュ

Day 1-3 (末梢持続点滴)

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
⑦	生食	500mL	46時間 持続点滴
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	
⑧	生食	50mL	フラッシュ

Day 8

《メイン》

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	30分
	クロルフェニラミン(ポラミン)	5mg	点滴
②	生食	250mL	1時間
	セツキシマブ	250mg/m ²	点滴
③	生食	100mL	1時間
			点滴