がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H22.7.8	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	大腸(CK)−012	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	Bev+CapeOX(XELOX)療法				
レジメン補足	ベバシズマブ+カペシタビン+オキサリプラチン				
がん腫など	結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ (アバスチン)	炎症	7.5mg/kg	●																											
オキサリプラチン (エルプラット)	炎症	130mg/m^2	●																											
カペシタビン (ゼローダ)		**※下図参照**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
1コース期間	21 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：(初回) 4時間 (2回目) 3時間30分 (3回目以降) 3時間																													
注意事項など	制吐目的に、Day2-3にデキサメタゾンの内服(8mg)もしくは点滴投与(6.6mg)を行うこと カペシタビンの投与量はC法を用いる																													

《カペシタビン投与量の目安》

体表面積(m^2)	～1.36	1.36 ～ 1.66	1.66 ～ 1.96	1.96～
カペシタビン投与量 (1日2回内服)	1200mg/回	1500mg/回	1800mg/回	2100mg/回

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	15分点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	100mL	**下記(※)** 点滴
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	
	※初回投与時は90分かける。初回投与時の忍容性が良好であれば2回目は60分で投与してもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降は30分で投与とする。		
③	生食	50mL	フラッシュ
④	5%ブドウ糖液	500mL	2時間点滴
	オキサリプラチン	130mg/m^2	
⑤	5%ブドウ糖液	100mL	フラッシュ