

### がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

登録日	H23.4.21	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ   ■ 入院及び外来   初回入院   ■ 必要		
レジメン番号	大腸(CK)-015	診療科名	消化器外科		
レジメン名	Bev+S-1療法				
レジメン補足	ベバシズマブ+S-1				
がん腫など	切除不能結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
ベバシズマブ (アバスタ)	炎症	5mg/kg	●															●																				
S-1 (TS-1)		※下図参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
薬剤名	漏出	投与量	5 (週)							6							7							8														
ベバシズマブ (アバスタ)	炎症	5mg/kg	●																																			
S-1 (TS-1)		※下図参照																																				
1コース期間	42 日	目標コース数				□有 (    コース)						■無 (PDまで)																										
点滴時間	Day1 : (初回) 1時間30分 (2回目) 1時間 (3回目以降) 30分																																					
注意事項など																																						

《S-1投与量の目安》

体表面積(m <sup>2</sup> )	~1.24	1.25 ~ 1.49	1.5~
S-1投与量 (1日2回内服)	80mg/day	100mg/day	120mg/day

**Day 1**

《メイン》

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	100mL	<b>下記(※)</b> 点滴
	ベバシズマブ	5mg/kg	
②	※初回投与時は90分かける。初回投与時の忍容性が良好であれば2回目は60分で投与してもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降は30分で投与とする。		
③	①の残りの生食でフラッシュ		