がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H27.3.31	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	大腸(CK)−016	診療科名	消化器外科		
レジメン名	【患者限定】Bev+UFT/LV療法				
レジメン補足	ベバシズマブ+UFT+ホリナート				
がん腫など	高齢者(75歳以上)の切除不能結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ (アバスチン)	炎症	5mg/kg	●														●													
UFT (ユーエフティー)		**※下図参照**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
ホリナート (ユーゼル)		75mg/日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
1コース期間	28 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：(初回) 1時間30分 (2回目) 1時間 (3回目以降) 30分																													
注意事項など																														

《UFT投与量の目安》

体表面積(m^2)	～1.17	1.17 ～ 1.49	1.50 ～ 1.83	1.83～
UFT投与量 (3分割内服)	300mg/day	400mg/day	500mg/day	600mg/day

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	100mL	**下記(※)** 点滴
	ベバシズマブ	5mg/kg	
	※初回投与時は90分かける。初回投与時の忍容性が良好であれば2回目は60分で投与してもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降は30分で投与とする。		
③	①の残りの生食でフラッシュ		