がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H21.10.8	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	大腸(CK)−017	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	セツキシマブ単剤療法				
レジメン補足					
がん腫など	切除不能結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
セツキシマブ (アービタックス)	炎症	400mg/m^2 (初回のみ)	○																											
セツキシマブ (アービタックス)	炎症	250mg/m^2	●																											
1コース期間	7 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：(初回) 3時間30分 (2回目以降) 2時間30分																													
注意事項など																														

Day 1 (初回)

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	点滴
②	生食	500mL	2時間
	セツキシマブ	400mg/m^2	点滴
③	生食	100mL	1時間
			点滴

Day 1 (2回目以降)

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	点滴
②	生食	250mL	1時間
	セツキシマブ	250mg/m^2	点滴
③	生食	100mL	1時間
			点滴