# がん化学療法レジメン

| 第1版 | 改訂日 | |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録日 | H21.10.8 | 実施区分 | □ 入院のみ ■ 入院及び外来 | 初回入院 | ■ 必要 |
| レジメン番号 | 大腸(CK)−018 | 診療科名 | 消化器内科・消化器外科 | | |
| レジメン名 | セツキシマブ+イリノテカン療法 | | | | |
| レジメン補足 | | | | | |
| がん腫など | 切除不能結腸・直腸癌 | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 1(週) | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| セツキシマブ(アービタックス) | 炎症 | 400mg/m$^2$(初回のみ) | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セツキシマブ(アービタックス) | 炎症 | 250mg/m$^2$ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| イリノテカン(トポテシン、カンプト) | 炎症 | 150mg/m$^2$ | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 5(週) | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| セツキシマブ(アービタックス) | 炎症 | 250mg/m$^2$ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン(トポテシン、カンプト) | 炎症 | 150mg/m$^2$ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1コース期間 | 49 日 | 目標コース数 | □有 ( コース) | ■無 (PDまで) |
| 点滴時間 | Day1 (初回)：5時間30分、 Day1 (2回目以降), 15, 29：4時間、 Day8, 22, 36, 43：2時間30分 | | | |
| 注意事項など | 制吐目的に、Day2-3, Day16-17, Day30-31にデキサメタゾンの内服(8mg)を行うこと | | | |

**Day 1 (初回)**

《メイン》

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量単位 | 点滴時間投与方法 |
|---|---|---|---|
| ① | 生食 | 100mL | 30分点滴 |
| | グラニセトロン | 3mg | |
| | デキサメタゾン(デキサート) | 9.9mg | |
| | クロルフェニラミン(ポララミン) | 5mg | |
| ② | 生食 | 500mL | 2時間点滴 |
| | セツキシマブ | 400mg/m$^2$ | |
| ③ | 生食 | 100mL | 1時間点滴 |
| ④ | 生食 | 500mL | 2時間点滴 |
| | イリノテカン | 150mg/m$^2$ | |
| ⑤ | 生食 | 50mL | フラッシュ |

**Day 1 (2回目以降), 15, 29**

《メイン》

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量単位 | 点滴時間投与方法 |
|---|---|---|---|
| ① | 生食 | 100mL | 30分点滴 |
| | グラニセトロン | 3mg | |
| | デキサメタゾン(デキサート) | 9.9mg | |
| | クロルフェニラミン(ポララミン) | 5mg | |
| ② | 生食 | 250mL | 1時間点滴 |
| | セツキシマブ | 250mg/m$^2$ | |
| ③ | 生食 | 100mL | 1時間点滴 |
| | ※2回目以降は過去のインフュージョンリアクションの有無を確認し、15分まで短縮可 | | |
| ④ | 生食 | 500mL | 2時間点滴 |
| | イリノテカン | 150mg/m$^2$ | |
| ⑤ | 生食 | 50mL | フラッシュ |

**Day 8, 22, 36, 43**

《メイン》

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量単位 | 点滴時間投与方法 |
|---|---|---|---|
| ① | 生食 | 100mL | 30分点滴 |
| | クロルフェニラミン(ポララミン) | 5mg | |
| ② | 生食 | 250mL | 1時間点滴 |
| | セツキシマブ | 250mg/m$^2$ | |
| ③ | 生食 | 100mL | 1時間点滴 |