がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H26.3.13	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	大腸(CK)−020	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	パニツムマブ+イリノテカン療法				
レジメン補足					
がん腫など	切除不能結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パニツムマブ (ベクティビックス)		6mg/kg	●																											
イリノテカン (トポテシン、カンプト)	炎症	150mg/m^2	●																											
1コース期間	14 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：4時間30分																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること 制吐目的に、Day2-3にデキサメタゾンの内服(8mg)を行うこと																													

Day 1

《メイン》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	15分点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	100mL	1時間点滴
	パニツムマブ	6mg/kg	
③	生食	100mL	1時間点滴
	※2回目以降は過去のインフュージョンリアクションの有無を確認し、15分まで短縮可		
④	生食	500mL	2時間点滴
	イリノテカン	150mg/m^2	
⑤	生食	50mL	フラッシュ