がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H22.1.14	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	大腸(CK)−022	診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	S-1+Bi-weekly イリノテカン療法				
レジメン補足					
がん腫など	結腸・直腸癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン (トポテシン、カンプト)	炎症	125mg/m^2	●														●													
S-1 (TS-1)		**※下図参照**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
1コース期間	28 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1, 15：2時間30分																													
注意事項など	制吐目的に、Day2-3, Day15-16にデキサメタゾンの内服(8mg)を行うこと																													

《S-1投与量の目安》

体表面積(m^2)	～1.24	1.25 ～ 1.49	1.5～
S-1投与量 (1日2回内服)	80mg/day	100mg/day	120mg/day

Day 1, 15

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	500mL	2時間 点滴
	イリノテカン	125mg/m^2	
③	生食	50mL	フラッシュ